



ODLINGS- OCH ANVÄNDNINGSLISTA

På de följande sidorna hittar du en sammanställning av sommarblommor med odlings- och användningsbeskrivningar. Vi har valt att uteslutande beskriva växter som vi själva har erfarenheter av.

Växternas namn står i mitten av odlings- och användningslistans uppslag – till vänster de vetenskapliga (latinska), till höger de svenska. Växterna är ordnade alfabetiskt efter de vetenskapliga namnen. Om du bara känner till det svenska namnet är det lättast att först slå upp det i registret längst bak i boken, där du hänvisas till det vetenskapliga namnet.

På vänstersidorna av listans uppslag finner du odlingsanvisningar under rubrikerna:

Kulturtid
Sticklingstid
Såtid
Ljusgroende
Såtemperatur
Odlingstemperatur
Krukstorlek
Odlingskommentar

På högersidorna av listans uppslag finner du användningsuppgifter under rubrikerna:

Höjd
Färg
Växtsätt och användningstips
Pålitlighet och användbarhet

På nästa uppslag finns närmare beskrivningar av vad som innehålls under de olika rubrikerna.

Vi hoppas att du ska ha nytta och hjälp i din odling av de erfarenheter som vi presenterat här. Utfallet påverkas emellertid alltid till viss del av de förutsättningar man har och var och en måste därför bli något av sin egen expert. Lycka till!

Såtemperatur i °C

Siffran anger optimal såtemperatur. Den ska ses som ett riktvärde, runt 20° brukar fungera bra för de flesta sommarblommor. Såtemperaturen gäller framförallt tills fröna har grott, sedan mår de flesta plantor bra av att stå lite svalare.
– anger att uppgift om såtemperatur saknas (20° är bra i de flesta fall). Vi har inte själva gjort några vetenskapliga undersökningar utan sammanställt uppgifter från fröfirmornas kataloger och Lantbruksuniversitetets skrifter och följt dem med gott resultat. Har vi några egna erfarenheter står de under Odlingskommentarer. Likaså om förfaringssättet behöver förklaras.

Odlingstemperatur i °C

Siffran anger optimal odlingstemperatur. Den gäller från och med att plantan skolats och ska ses som ett riktvärde. Odlar man många sorter i ett och samma växthus måste man givetvis kompromissa. Enligt våra erfarenheter är 18° lämpligt till flertalet arter. Observera att den angivna odlingstemperaturen gäller vid god ljustillgång. Vid sämre ljustillgång måste man ha lägre temperatur för att inte plantorna ska bli långa och gängliga. Soliga dagar däremot kan temperaturen få bli högre. Låg siffra efter hög siffra betyder att plantorna mår bra av att få lägre temperatur när de växt till sig lite.
– anger att uppgift saknas (18° lämpligt för flertalet arter). Också här har vi här har vi sammanställt uppgifter från bl a frökataloger. Se Såtemperatur ovan.

Krukstorlek i cm

Här anges lämplig krukstorlek för respektive växtslag. Siffrorna anger krukans diameter i centimeter. Står det 9–10–15 betyder det att plantan först sätts i en kruka med diametern 9 eller 10 cm. Senare när krukan är fylld av rötter planteras växten om i en 15 cm kruka. Stora övervintrande exemplar av tex fuchsia och margerit kan behöva mycket stora krukor. Krukstorlek för dessa anges inte.

Odlingskommentarer

Här kan du hitta **uppgifter som rör förökningen och odlingen** av växten ifråga. Om det är lämpligt att så fröna direkt i slutkrukan står det här angivet hur många frön per kruka som är lagom. Anges inget annat är det bäst att så och skola som vanligt, se kapitlet "Handledning — sådd och sticklingar", sid 61. I denna kolumn får du också veta hur eventuella moderplantor ska övervintras, om småplantorna behöver toppas eller om de brukar behöva bindas upp.

Ljusgroende

Ett "Lj" i denna kolumn innebär att fröna ska sås ytligt och inte täckas med jord eller sand. Fröna behöver antingen ljus för att gro eller är så små att de inte orkar ta sig igenom en täckning. Tänk på att sådder utan täckning är känsligare för uttorkning! Läs vidare om sådder på sid 61.

Såtid (kalendervecka)

Här anges i vilken vecka vi sår den aktuella växten för att ha en välvuxen planta, som just börjat blomma, **färdig till utplanteringen i början av juni**. Tiden är anpassad efter våra odlingsförhållanden och kan givetvis behöva justeras. Om du inte odlat en växt förut är det lämpligt att först prova den angivna såtiden, föra anteckningar och vid behov ändra såtid till nästa år.

Om du odlar inomhus på fönsterbrädan bör du så ett par veckor senare än vad som är angivet här. Detta gäller framförallt de växter som sås tidigt på våren (slutet av mars och tidigare). Bristen på ljus tidigt på våren gör annars att plantorna blir långa och gängliga. Se kapitlet "Handledning — sådd och sticklingar", sid 61.

Sticklingstid (kalendervecka)

Här anges i vilken vecka vi tar sticklingar på den aktuella växten.

Observera att vi köper sticklingar av vissa vanliga sommarblommor. I sådana fall står det "köpt" under angivet veckonummer. Vill man ta sticklingar från egna moderplantor på dessa växter måste man dra ifrån den tid det tar för sticklingen att få rötter, mestadels ca två veckor.

Kulturtid (antal veckor)

Kulturtid är den tid det tar att odla fram en växt från det man sår eller tar sticklingar tills man har en utplanteringsbar planta.

Observera att för de växtslag där vi brukar köpa rotade sticklingar har kulturtiden räknats från färdigrotad stickling.

Växter som kan förökas både med frön och sticklingar har olika kulturtider beroende på vilket förökningssätt man väljer.

Tänk på att en odlingsvecka i maj motsvarar två veckor i februari.

Vetenskapligt namn

Se överst på nästa sida.

Vetenskapligt namn

Växterna är ordnade alfabetiskt efter det vetenskapliga namnet.

() Synonymer, tex tidigare använda namn, står inom parentes.

" " Felaktiga namn, som ändå ofta används, står inom citationstecken.

Växternas familjenamn står i svart text i kolumnen för vetenskapliga namn. Vi använder genomgående familjenamn som slutar på -aceae. Tex används familjenamnet Asteraceae istället för det äldre Compositae.

Ibland kan samma vetenskapliga namn finnas på två rader. Det kan tex vara höga respektive låga sorter av samma art som skiljer sig så pass mycket åt vad gäller odling, utseende eller användning att vi beslutat oss för att ge dem var sin rad. Läs mer om växters vetenskapliga namn på sid 31.

Svenskt namn

Vi använder de svenska namn som anges i det *Kulturväxtlexikon* som förväntas komma ut under 1997.

I några fall har vi tagit med synonyma svenska namn som vi vet har stor spridning, men det är alltid det första namnet som är att föredra enligt *Kulturväxtlexikon*.

Ordet (gräs) efter det svenska namnet är ett förtydligande av att växten ifråga är ett prydningsgräs.

Höjd

Anges som låg, mellan eller hög.

Låg — upp till 30 cm
Mellan — 30–80 cm

Hög — över 80 cm
Vi har valt att inte ange en mer detaljerad höjdangivelse eftersom planterna kan variera kraftigt beroende på odlingsbetingelser, årsår, konkurrens från andra växter o.s.v.
För klättrare anges rankornas ungefärliga längd i meter.

Så här läser du Odlings- och användningslistan:

Växternas namn står i rött i mitten av uppslaget och är ordnade alfabetiskt efter de vetenskapliga namnen.

I fältet till vänster om namnen står odlingsanvisningar, tex om växten förökas med frön eller sticklingar, vid vilken tidpunkt det är lagom att så, vilken kruksstorlek den behöver o.s.v.

I fältet till höger om namnen står uppgifter om växtens utseende och användning. Där finns även en personlig kommentar från oss.

Färg

Vi har försökt att hålla oss till färgangivelserna vit, gul, orange, röd, rosa, violett, blå, grön, brun, grå och svart, eller en kombination av dessa.

Benämningen ljus respektive mörk har också använts.
Däremot har vi försökt att undvika fantasior som honungsgul, blodröd o.s.v. Vi har gjort ett undantag för beteckningen klarblå som beskriver en hos växter ovanlig rent blå färg utan dragning åt violett (den blir inte heller som de flesta blå blommor violett-rosa på foto).

I de fall där bladverket är en del av effekten har färgen på detta angetts.

Ordet disk anger blomställningens mitt hos de korgblommiga växterna, tex solros, prästkrage.

Växtsätt och användningstips

Vi har valt att skilja ut och beskriva sådana växtsätt och utseenden som ger växten en speciell "roll" i uppsättningen. Någon allmän beskrivning av samtliga växters utseende finns alltså inte. De växter som faller utanför rubriceringen kan tillföra planteringen väl så mycket i skönhetssvärde, men har inte lika distinkta användningsområden.

Växtsätt:

Vävande — har oftast ett mjukt och grenigt växtsätt där stjälkarna väver sig in emellan och flåtar sig samman med andra växter.

Svavande — har blommorna eller blomställningarna på förhållandevis långa och bladlösa stjälkar. Passar att sväva över och mellan stelare växter.

Vällande — har blommor eller blad som väller ända ner mot marken. Man ser oftast inte var växten är förankrad i jorden. Låga vällande växter passar som uppmijkande kant i rabatter samt i urnor och balkonglädor.

Spira/Spiror — har upprättstående och accentuerade blomställningar som väl höjer sig över bladverket.

Hängande — har ofta ganska veka stjälkar som följsamt viker sig nedåt. Passar bra i kant på urnor, krukor och balkonglädor. Många även som uppmijkande kant i rabatter.

Mattbildande — har krypande eller liggande egenskaper och bildar en mer eller mindre tät matta. Begreppet är något vagt.

Stätilig — höga, stadiga växter som kan användas som stomme i rabatter och stora urnor. Även som solitärer.

Klättrande — har långa rankor som med lite hjälp klättrar själva.

Pålitlighet och användbarhet

Här har vi betygssatt de enskilda växterna enligt skalan **Mindre god**, **God** och **Mycket god**. Vissa växter som vi har svårt att klara oss utan har dessutom fått tilläget **Favorit!**

År växterns pålitlighet Mindre god eller God har vi gett en förklaring till varför vi tycker så.

År det ändå har vi gett en förklaring till varför vi tycker så.

| Odlings- kommentarer | Kruktöck cm | Odlingstemperatur | Sätemperatur | Ljusgrönende | Safid | Sticklingstid | Kulturtid | Vetenskapligt namn (Synonym) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Växts och användningstips | Pålitlighet och användbarhet |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Vissa sorter blommar bra redan första året t ex 'Summer Carnival'. Kan också odlas som 2-årig, sås då på sensommaren. | 10–11 | 15–10° | 18° | – | V 9 alt. sen- sommars | – | 14 v | <i>Alcea rosea</i> (syn. <i>Althaea r.</i>) Malvaceae | Steckros | Hög | Många olika | Blomställningen kan behöva bindas upp. | God |
| Trivs bäst ljus och svalt. Blir lätt svampangripen i odling. Odla gärna i pluggbrätt eftersom svampen inte sprids så lätt dä. Övervintras i 13–15°. Vi brukar köpa från Ronneby parkförvaltning eftersom behovet av färgvarianter varierar. | 6–7 eller plugg- brätt | – | – | – | – | V 14 köpt | 9 v fr. rotad stickl. | <i>Alternanthera ficoidea</i> Amaranthaceae | Papegojblad | Låg | Används för bladverkets skull. Finns i rosa-, röd-, brun- och grönmelerat. | Svagväxande. Klippbar för formella rabatter. Bra som framkant och infästningsväxt. Färgerna blir vackrast i full sol. | Mycket god |
| Kan behöva bindas upp. | 10–11 | 15° | 20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Amaranthus caudatus</i> Amaranthaceae | Rävsvans | Mellan–hög | Rosaröd, ljusgrön | Placeras så att svansarna får hänga fritt. Tuff som snittblomma. Kan behöva bindas upp. | Mycket god — Favorit! |
| Kan behöva bindas upp. | 10–11 | 15° | 20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Amaranthus cruentus</i> (syn. <i>A. paniculatus</i>) Amaranthaceae | Blodamarant | Mellan–hög | Brunröd (mörka blad) | | God |
| | 10–11 | 15° | 20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Amaranthus hypochondriacus</i> Amaranthaceae | Toppamarant | Låg, mellan | Brunröd (mörka blad), ljusgrön | Har upprätta kolar. | Mycket god |
| | 9–10 | – | – | – | V 12 | – | 11 v | <i>Anchusa capensis</i> Boraginaceae | Afrikansk oxunga | Låg | Klarblå, rosa | | God — blommar inte hela sommaren. |
| Kan sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 18 | – | 5 v | <i>Anethum graveolens</i> Apiaceae | Dill | Hög | Gulgrön | Vävande, svävande. | Mindre god Kort blomningstid. Använd fänkål istället. |
| De höga kan behöva bindas upp. | 10–11 | 12–15° | 18–20° | Lj | V 14 | – | 9 v | <i>Antirrhinum majus</i> Scrophulariaceae | Lejongap | Låg–mellan–hög | Rosa, röd, gul, vit, rödviolett, orange | Spiror (de mellan–höga). Bra som framkant (de låga). Utblommade spiror klipps bort. De höga kan behövas bindas upp. | God—mycket god, beroende på sort. En del sorter har en svacka i blomningen mitt på sommaren. — Favorit! |
| Sätt 2 sticklingar per kruka. Övervintras ljus och svalt. | 8–9 | – | – | – | – | V 14 | 9 v | <i>Aptenia cordifolia</i> "Variegata" Aizoaceae | Hjärtrema, brokbladig | Låg | Vitbrokigt bladverk (rödrosa blommor) | Mattbildande, ganska svagväxande. Klarar torra och näringssättig jord. | Mycket god |
| Övervintras ljus och svalt, 5–10°. | 10–11 | 18–15° | – | – | – | V 13 | 10 v | <i>Argyranthemum frutescens</i> (syn. <i>Chrysanthemum frutescens</i>) Asteraceae | Buskmargerit | Mellan | Vit, gul (gul disk) | Kan stammas upp. Önskas stora exemplar, använd övervintringsplantorna. | Mycket god — Favorit! |
| Övervintras ljus och svalt. | 10–11 | – | – | – | – | V 14 | 9 v | <i>Argyranthemum maderense</i> (syn. <i>Chrysanthemum maderense</i>) Asteraceae | Gul margerit | Mellan | Ljusgul | Kan stammas upp. Önskas stora exemplar använd de övervintrade plantorna. | Mindre god Blommar däligt en period mitt på sommaren. Använd namnsorter av <i>Argyranthemum frutescens</i> istället. |
| | 10–11 | – | – | – | V 11 | – | 12 v | <i>Asclepias curassavica</i> Asclepiadaceae | Röd sidenört | Mellan | Röd–orangegul, gul | Tål någon torra. | God |
| Kan även sås direkt på växtplatsen. | 10–11 | – | – | – | V 17 | – | 6 v | <i>Atriplex hortensis</i> Chenopodiaceae | Trädgårdsmålia | Hög | Hela växten färgad i grönt, rödbrunt eller orangegult. Blommor obetydliga. | Bladen kan användas i sallader. Fröställningen kan även användas som eternell. | God |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan sås direkt på växtplatsen. | 10–11 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Avena sativa</i> Poaceae | Havre (gräs) | Mellan | Grägröna vippor, senare gulbeige | Även eternell. | Mindre god |
| Så ett par frön per kruka. När fröna grott, klipp bort alla plantor utom en per kruka. Mår bra av att odlas på undervarme. Ge jämna näring- och vatten tillförsel, annars kan plantorna gå i blom i förtid och stanna i växten. | 10–11 | 15–18° | 20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Bassia scoparia</i> (syn. <i>Kochia scoparia</i>) Chenopodiaceae | Sommarcypress | Mellan (–hög) | Skirt grönt bladverk. Sorten 'Trichophylla' blir röd på hösten medan 'Childsii' förblir grön. | God Ogynnsamma förhållanden som torra och näringssättig kan göra att plantan går i blom och stannar i växten. | |

| Odlings- kommentarer | Krukturlek cm | Ödlingstemperatur | Såtemperatur | Ljusgrunde | Såtid | Stickningstid | Veteriskapig, hinn (Synonym) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Värtsätt och användningsstips | Plättighet och använtbarhet | |
|--|-----------------|-------------------|--------------|------------|-------|---------------|---|--|---------------------|------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fröna är mycket små. Pelleterat frö är enklare att så men ännu viktigare att hålla fuktigt. Begonia växer långsamt i början. Så glesst, gödselvattna i såldan, då växer småplantorna till bättre och blir lättare att handskas med vid skölningen. | 8–9 | 18° | 25° | Lj | V 10 | – | 13 v | <i>Begonia × hortensis</i> Semperflorenes-gruppen Begoniaceae | Sommarbegonia | Låg | Rosa, röd, vit, även mörkbladiga | Bra som framkant. Tål torka och skugga bättre än de flesta. | Mycket god |
| Se sommarbegonia. Knölarna kan sparas från år till år. Övervintras mörkt och svalt, 5–7°. | 9–10 | 20–18° | 25° | Lj | V 5 | – | 18 v | <i>Begonia × tuberhybrida</i> Begoniaceae | Knölbegonia | Låg | Rosa, röd, gul, vit, orange, även mörkbladiga | Tål skugga. Det finns hängande sorten som är bra till urnor och ampler i halv- eller helskugga. | Mycket god |
| | 9–10 | – | – | – | V 18 | – | 5 v | <i>Beta vulgaris</i> Mangold-gruppen Chenopodiaceae | Mangold | Låg–mellan | Vita, rosa, röda bladskaft och bladnerver | För bästa effekt placera så att de färggranna bladskafta syns. | God Vissa sorter stocklöper lätt. |
| | 9–10 | 15° | 18–20° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Beta vulgaris</i> Stjärmangold-gruppen Chenopodiaceae | Stjärmangold | Låg | Brunröda blad | Bra som framkant. | Mycket god |
| Det finns även sticklingsförökade sorter. Dessa har vi dock aldrig provat. | 10–11 | 16° | 18–20° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Bidens ferulifolia</i> Asteraceae | Ampelskära | Låg–mellan | Gul | Vällande, mattbildande, hängande. Tål halvskugga. | Mycket god |
| Så 8–10 frön direkt i slutkruka. | 9–10 | 14–16° | 20–22° | Lj | V 16 | – | 7 v | <i>Brachyscome iberidifolia</i> (<i>Brachycome i.</i>) Asteraceae | Dockkrage | Låg | Violett, rosa, vit | Vällande. | God — blommar inte hela sommaren. |
| Sätt 3 sticklingar per kruka. Övervintras ljust och svalt. | 9–10 | 20–18° | – | – | – | V 13 | 10 v | <i>Brachyscome multifida</i> (<i>Brachycome m.</i>) Asteraceae | Blåkrage | Låg | Violett (gul disk) | Vällande, mattbildande. Tål ej torka. | Mycket god — Favorit! |
| Krukas och planteras djupt för att bli stadiga. | 9–10 | 12–14° | 18° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Brassica oleracea</i> Prydnadskåls-gruppen Brassicaceae | Prydnadskål | Låg–mellan | Vit-, rosa-, grönbrokiga blad | Kräver låga temperaturer för god färgsättning, därför vackrast på hösten. Kan användas i höstplanteringar då den tål frost. | Mycket god |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 15 | – | 8 v | <i>Briza maxima</i> Poaceae | Italienskt darrgräs | Mellan | Först grågrön, senare gulbeige | Rasslar trevligt i vinden. Även eternell. | Mycket god |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. | 9–10 | – | – | – | V 15 | – | 8 v | <i>Briza minor</i> Poaceae | Dvärgdarrgräs | Låg–mellan | Först grågrön, senare gulbeige | Även eternell. | Mycket god |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Bromus lanceolatus</i> Poaceae | Skruvlost (gräs) | Mellan | Grågrön | Även eternell. | God |
| Kan behövas toppas. Låga odlingstemperaturer kan tillfälligt ge gula blad. | 10–11 | 18° | 18–20° | Lj | V 11 | – | 12 v | <i>Calceolaria integrifolia</i> Scrophulariaceae | Busktoffel | Låg | Gul | | Mycket god — Favorit! |
| Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | 15° | 18° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Calendula officinalis</i> Asteraceae | Ringblomma | Låg–mellan | Gul, orange | Vävande, gäller enstaka plantor. Plocka fröställningar regelbundet. | Mycket god |
| | 9–10 | 15° | 18° | – | V 10 | – | 13 v | <i>Callistephus chinensis</i> Asteraceae | Sommaraster | Låg–mellan | Många färger | Kan behöva bindas upp. Plocka bort vissna blommor. | God — blommar inte hela sommaren. |
| Kannans jordstammar måste övervintras frostfritt. Se vidare sid 150. | 20 och uppåt | – | – | – | – | – | – | <i>Canna × generalis</i> Cannaceae | Kanna | Hög | Gul, orange, röd, rosa, även mörkbladiga | Stärtig! Kan även stå planterad i vatten. | God—mycket god Hinner inte alltid i blom kalla somrar. Men det kraftfulla bladverket har ett högt prydnadsvärde i sig. |
| Skola 3–5 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | 16° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Centaurea cyanus</i> Asteraceae | Blåklint | Mellan | Blå, rosa, vit | Vävande, svävande. Blommar längre om den plockas. Klarrar näringstättig jord. Även eternell. | God — vekt växtsätt. |
| Kan även sås direkt på växtplatsen. | 10–11 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Chenopodium botrys</i> , säljs även som "Ambrosia mexicana" (sorten "Jerusalem Oak") Chenopodiaceae | Ekmålla | Mellan | Grön–gulgrön | Aromatiskt bladverk. | Mindre god — blir brun på eftersommaren. |

| Odlings-kommentarer | Kruktöle cm | Odlingstemperatur | Såltolerans | Ljusgrönande | Säffid | Sticklingstid | Kulturtid | Vetenskapligt namn (synonym) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Växtsätt och användningstips | Pallitghet och användbarhet |
|---|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------|---------------|--|--|----------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Kan även sås direkt på växtplatsen. | 10–11 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Chenopodium schradianum</i> , säljs även som "Ambrosinia mexicana" (sorten 'Green Magic') Chenopodiaceae | Drakmålla | Hög | Grön–gulgrön | Vävande. Spira. Aromatiskt bladverk. Även eternell. | God — blir något brun på efter-sommaren. |
| | | | | | | | | <i>Chrysanthemum frutescens</i> se <i>Argyranthemum frutescens</i> | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Chrysanthemum multicaule</i> se <i>Coleostephus multicaulis</i> | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Chrysanthemum paludosum</i> se <i>Mauranthenum paludosum</i> | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Chrysanthemum parthenium</i> se <i>Tanacetum parthenium</i> | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Chrysanthemum ptarmiciflorum</i> se <i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> | | | | | |
| | | | | | | | | <i>Chrysanthemum × superbum</i> se <i>Leucanthemum × superbum</i> | | | | | |
| Kan behöva bindas upp. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | 15–20° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Clarkia amoena</i> (syn. <i>Godetia amoena</i>) Onagraceae | Atlasblomma | Mellan | Rosa, orange, röd, vit, ofta blanda färger | | God |
| Kan behöva bindas upp. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–11 | – | – | – | V 17 | – | 6 v | <i>Clarkia unguiculata</i> (syn. <i>C. elegans</i>) Onagraceae | Clarkia | Mellan, hög | Rosa, röd, vit | | God |
| Behöver stora krukor. Blanda i en näve såckad kogödsel i botten av krukan. | 10–11 →20 | 20–16° 20° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Cleome hassleriana</i> (syn. <i>C. spinosa</i>) Capparaceae | Paradisblomster | Hög | Rosa, rödviolett, vit | Stärtig! En av de bästa höga. | Mycket god — Favorit! | |
| Lägg fröna i ljummet vatten 1 timme före sädd. Använd stor kruka och ge plantan en pinne att klättra på. | 11–12 →15 | 15–16° 20° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Cobaea scandens</i> Polemoniaceae | Klockranka | 2–4 m | Violett (mörkt bladverk) | Klättrande. | God Blommar sent på sommaren, men även bladverket är vackert. | |
| | 9–10 | 15–17° 18° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Coleostephus multicaulis</i> (syn. <i>Chrysanthemum multicaule</i>) Asteraceae | Dvärgkrage | Låg | Gul, ljust gul | Vällande. | Mycket god | |
| För bättre groning prova att kyla fröet i +2° under en vecka före sädd. Kan behöva bindas upp. | 10–11 | – | 13–18° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Consolida ajacis</i> (syn. <i>Delphinium ambiguum</i>) Ranunculaceae | Romersk riddersporre | Hög | Blå, rosa, vit, violett, ljust orange | Vävande. Behöver bindas upp. Även eternell. | God — blommar inte hela sommaren. |
| Så 5–7 frön per slutkruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 8–9 | – | 15–18° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Convolvulus tricolor</i> Convolvulaceae | Blåvinda | Låg | Blåviolett, med gul och vit mitt | Mattbildande, hängande. Putsas för ihållande blomning. | God |
| | 9–10 | – | 18–24° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Coreopsis grandiflora</i> Asteraceae | Flicköga | Mellan | Gul | Kan även användas som perenn. | God |
| | 9–10 | – | – | – | V 15 | – | 8 v | <i>Coreopsis tinctoria</i> Asteraceae | Tigeröga | Låg, mellan | Brunröd, gul | Vävande, svävande (gäller de mellanhöga). | God |
| Kan behöva bindas upp. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 10–11 | 15–10° 18° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Cosmos bipinnatus</i> Asteraceae | Rosenskära | Mellan–hög | Rosa, rosaröd, vit, även ljust gul | Vävande. Putsa bort de vissna blommorna för längre blomningstid. | Mycket god — Favorit! Den ljust gula sorten 'Butterkist' hinner sällan i blom men har ett frodigt och fylligt bladverk. | |
| | 10–11 | – | 18° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Cosmos sulphureus</i> Asteraceae | Gullskära | Mellan | Orange, orangeröd, gul | Vävande, svävande. | Mycket god — Favorit! |

| Odlings- kommentarer | Kruks storlek cm | Odlingstemperatur | Såtemperatur | Ljusgrände | Såtid | Stickningstid | Kulturtid | Vetenskapligt namn (synonymer) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Värtsätt och användnings tips | Plattnähet och användbarhet |
|--|---|-------------------|--------------|------------|----------------|---------------|------------------------------|--|---|----------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9–10 | 14–16° | 20° | – | V 6 | – | 17 v | <i>Craspedia globosa</i> Asteraceae | Solblöll | Mellan | Gul | Svåvande. Även eternell. | God |
| Kan behöva toppas. | 9–10 | 15–18° | 20° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Cuphea ignea</i> Lythraceae | Cigarettblöd, även bågarblomma | Låg | Orange | Vållande. | Mycket god |
| Övervintras i just och svart. | 8–9 | – | – | – | – | V 12 | 11 v | <i>Cuphea hyssopifolia</i> Lythraceae | Isopskuféa | Låg | Rosa | Bra som framkant. | God |
| Vi brukar så vid två tidpunkter, med 3 veckors intervall, och blandar sedan plantorna vid planteringen för att blomningen ska pågå längre. | 10–11 | – | – | – | V 11 och 14 | – | 12 v alt 9 v | <i>Cynoglossum amabile</i> Boraginaceae | Kinesisk förgätmigej | Mellan | Ljust klarblå, även vit och rosa | Våvande. | God — Favorit! Blommar sällan hela sommaren, därför sår vi vid två tidpunkter. |
| | 10–11 | 16° | 20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Dahlia × hortensis</i> Sommardahlia-gruppen (fröförökad) Asteraceae | Sommardahlia | Mellan | Gul, vit, röd, rosa, rödviolett | Plocka bort överblommade blommor. | Mycket god — Favorit! |
| Dahliaknölar måste övervintras frostfritt. Se vidare sid 150. | 15–20 | 15–16° | – | – | – | – | 6 v fr. knöll | <i>Dahlia × hortensis</i> (knöllar) Asteraceae | Dahlia | Låg–mellan–hög | Gul, vit, röd, rosa, violett, orange, även tvåfärgade | Höga sorter behöver bindas upp. Sätt en pinne till varje stjälk. | Mycket god |
| | <i>Delphinium ambiguum</i> se <i>Consolida ajacis</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 10–11 | – | – | – | V 12 | – | 11 v | <i>Delphinium elatum</i> Ranunculaceae | Stor riddersporre | Hög | Blå, violett, vit, rosa | Kan även användas som perenn. | God — blommar först på efter-sommaren. |
| | 9–10 | – | 13–18° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Delphinium grandiflorum</i> Ranunculaceae | Kinesisk riddersporre | Mellan | Klarblå | Våvande, svåvande. | God — Favorit! Blommar inte hela sommaren. |
| | 8–9 | 15–25° | – | – | V 10 | – | 13 v | <i>Dianthus barbatus</i> Caryophyllaceae | Borstnejlik | Mellan | Blandade färger i rosa, rosarött och vitt | Här avses sorter som blommar redan första året. Borstnejlikan är annars vanligen tvåårig. Doftar. | God — blommar inte från början av sommaren. |
| Minska vatten- och näringstillförseln mot slutet av odlingen. | 8 | 15° | 18–20° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Dianthus chinensis</i> Caryophyllaceae | Sommarnejlik | Låg | Rosa, röd, rödviolett, vit | Tål torka bra. | Mycket god — Favorit! |
| Sätt 1–2 stickningar per kruka. | 9–11 | 18–15° | – | – | – | V 12 köpt | 11 v fr. rotad stickl. | <i>Dianthus × sempervirens</i> Caryophyllaceae | Ampelnejlik, även bayersk hängnejlik | Låg | Mörkt rosaröd | Vållande. Tål torka bra. | Mycket god — Favorit! |
| Kan behöva toppas. Det finns sorter som förökas med stickningar. Dessa har vi dock aldrig provat. | 9–10 | 12–18° | 15–17° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Diascia barberae</i> Scrophulariaceae | Twillingssporre, även twillingblomma | Låg | Rosa | Våvande, vållande, hängande. | Mycket god |
| | 10–11 | – | 18–22° | – | V 15 | – | 8 v | <i>Dolichos lablab</i> (syn. <i>Lablab purpureus</i>) Fabaceae | Hjälmböna | 2–3 m | Rosa, mörkt bladverk | Klätrande. De vackra vinröda bladerna äts som grönsak i bl a Indien. | God |
| Sås ev direkt i slutkruka, ca 5 frön per kruka. Kan även sås direkt på växtplassen. | 7–8 | 15° | 18–20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Dorothanthus bellidiformis</i> Aizoaceae | Stor doroteablomma | Låg | Oftast blandade färger samt ljusgul, vit och rosa | Mattbildande, något vållande. Tål torka bra. | God — slår ihop blommorna vid mulet väder. |
| | 10–11 | 16° | 18–21° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Dracopis amplexicaulis</i> (syn. <i>Rudbeckia a.</i>) Asteraceae | Draköga | Mellan–hög | Gul (mörk disk) | Våvande. | Mycket god |
| Sätt 2–3 planter i en stor kruka och ge dem en pinne att klättra på. | 11–12 | – | 13–16° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Ecremocarpus scaber</i> Bignoniaceae | Fackelranka | 2–3 m | Gul, orange, röd, oftast blandade | Klätrande, | Mycket god |
| Kan även sås direkt på växtplassen. | 9–10 | 12–16° | 14–18° | – | V 18 | – | 5 v | <i>Echium plantagineum</i> Boraginaceae | Blå snokört | Låg–mellan | Ljusblå | Vållande. | Mycket god |
| Echeverior måste övervintras frostfritt. Se vidare sid 150. | – | – | – | – | – | – | – | <i>Echeveria</i> , olika arter Crassulaceae | Echeveria | Låg | Grått, grågrönt eller grönt bladverk i rosetter | Bra till formella kanter och till figurabatter. Även för låga urnor (fat) och små krukor. Tål torka bra. | Mycket god |

| Odlings- kommentarer | Kruktorlek cm Odlings-temperatur Sätemperatur Ljusgroende Sådd Sticklingstid Kulturtid | | | | | | | Vetenskaplig namn (Synonym) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Värtsätt och använtningstips | Painlighet och användbarhet |
|---|--|--------------------|--------------|-------------|------|---------------|--|--|---|------------|---|--|---|
| | Kruktorlek cm | Odlings-temperatur | Sätemperatur | Ljusgroende | Sådd | Sticklingstid | Kulturtid | | | | | | |
| Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | 12–16° | 14–18° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Emilia coccinea</i> (syn. <i>E. sonchifolia</i>) Asteraceae | Tofsblomster | Mellan | Örangeröd | Vävande, svävande. Självsår sig lätt. | Mindre god — har en ful ogräslik fröställning. |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. | 9–10 | – | – | – | V 15 | – | 8 v | <i>Eragrostis tef</i> (syn. <i>E. abyssinica</i>) Poaceae | Teff, även kärleksgräs | Mellan | Grågröna vippor | Mjukt svepande. | Mycket god |
| | 9–10 | – | 15–18° | Lj | V 12 | – | 11 v | <i>Erigeron karvinskianus</i> Asteraceae | Murbinka | Låg | Vitrosa | Vällande, mattbildande. Bra till amalar. Vävande tillsammans med andra småväxta plantor. | Mycket god |
| Sås direkt i kruka. Kan toppas för bättre förgrening. Växer långsamt i början. | 7–8 →12 | 18–20° | 20–25° | – | V 6 | – | 17 v | <i>Eucalyptus globulus</i> Myrtaceae | Feberträd | Mellan–hög | Grått bladverk | | God — trög i starten. |
| Toppas för städigare planta. Övervintras ljus och svalt, 5–10°. | 9–10 | 14–18° | – | – | – | V 13 | 10 v | <i>Felicia amelloides</i> Asteraceae | Kapaster | Låg–mellan | Blå, ljusblå (gul disk) | | God Blommar båst på för- och eftersommaren. |
| Övervintras ljus och svalt, 5–10°. | 9–10 | – | – | – | – | V 13 | 10 v | <i>Felicia amelloides</i> 'Variegata' Asteraceae | Kapaster, brokbladig | Låg | Blå (gul disk), vitbrokiga blad | Mattbildande. | Mycket god — Favorit! |
| | 10–11 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Foeniculum vulgare</i> Apiaceae | Fänkål, sorter med brunt blad- verk kallas bronsfänkål | Hög | Gul, sorter 'Smokey' har mörkt bladverk | Vävande, svävande, liknar dill (<i>Anethum</i>) men blommar längre. | Mycket god |
| De flesta sorter behöver toppas. Sticklingsförökade sorter övervintras ljus och svalt, 5–10°. | 10–11 | 18–20° | 21–24° | – | V 8 | V 14 | 15 v fr. frö. 9 v fr. stickl. | <i>Fuchsia × hybrida</i> Onagraceae | Fuchsia, även bloddroppe | Mellan | Röd, rosa, violett, vit, ofta tvärfärgade | Kan stammas upp. Önskas större exemplar använd övervintringsplanta. Finns upprätt- växande, halvhängande och hängande sorter. En av de få sommarblommor som trivs bra i skugga. | Mycket god — Favorit! |
| Övervintras ljus och svalt, 5–10°. | 10–11 | 18–20° | – | – | – | V 13 | 10 v | <i>Fuchsia Triphylla</i> -gruppen Onagraceae | Pipfuchsia | Mellan | Örangeröd | Önskas större exemplar använd över- vintringsplanta. | Mycket god |
| | 10–11 | – | 20–23° | – | V 10 | – | 13 v | <i>Gaura lindheimeri</i> Onagraceae | Sommarljus | Mellan–hög | Vitrosa | Vävande. Kan överleva milda vintrar. | Mycket god — Favorit! |
| | 9–10 | 13–15° | 18–20° | – | V 10 | – | 13 v | <i>Gazania Pavonia</i> -gruppen Asteraceae | Päfågelsblomster | Låg | Gul, orange, brunorange, rosa, vit — gul även med grått bladverk | Tål torka bra. | God — slår ihop blommorna vid mulet väder. |
| Odlas båst hängande. Önskas kraftiga plantor använd höststicklingarna. Övervintras ljus och svalt. | 9–10 | – | – | – | – | V 12 | 11 v | <i>Glechoma hederacea</i> 'Variegata' Lamiaceae | Jordrevs, brokbladig | Låg | Bommor obetydliga. Odlas framförallt för sitt vitbrokiga bladverk. | Mattbildande (rotsläende), hängande. Kan även användas som perenn. | God Får lätt mjöldagg. |
| Lägg fröna i vatten 2 dygn före sådd. | 9–10 | – | 18–20° | Lj | V 12 | – | 11 v | <i>Gomphrena haageana</i> Amaranthaceae | Guldamarant | Mellan | Orange, röd | Svävande. Även eternell. | God |
| Sköla 3 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 8–9 | – | – | – | V 17 | – | 6 v | <i>Gypsophila elegans</i> Caryophyllaceae | Sommarslöja | Mellan | Vit | Vävande, vällande. | Mindre god Blommar inte hela sommaren. |
| Så ca 10 frön per slutkruka. Toppa när plantorna är 5 cm. | 7–8 | 15–18° | 18–20° | Lj | V 14 | – | 9 v | <i>Gypsophila muralis</i> Caryophyllaceae | Grusnejlika | Låg | Rosa | Vällande, något hängande. | God — slår ihop blommorna. |
| Toppas. Önskas kraftiga plantor använd övervintrings- plantan. Övervintras ljus och svalt, 5–10°. | 10–11 | – | – | – | – | V 8 | 15 v | <i>Hebe × andersonii</i> Scrophulariaceae | Buskveronica | Mellan | Grönt, vitbrokigt eller röd- brunt bladverk, Violetta blommor på sensommaren. | Tål frost och kan användas i höst- planteringar. | Mycket god |
| Behöver bindas upp. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 11–12 | – | 15–20° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Helianthus annuus</i> Asteraceae | Solros | Mellan–hög | Gul, ljusgul, brunröd (brun disk) | Många nya sortter. Vissa förgrenar sig och får nya blommor hela sommaren, medan andra bara har en blomställning i toppen. Spara fröställningen till småfäglarna. | God—mycket god, se växtsätt. |

| Odlings- kommentarer | Kruktöle cm | Odlings- temperatur | Såmäpperatur | Ijusgroende | Såtid | Sticklings- tid | Kulturtid | Vetenskaplig namn (Synonym) | Svenskt namn | Höjd | Färg | Växtart och användningsstips | Pålitlighet och användbarhet | |
|--|----------------|------------------------|--------------|-------------|-------|--------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>"Helichrysum microphyllum"</i> se <i>Plecostachys serpylloides</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Sätt 1–2 sticklingar per kruka. Övervintras ljus och svalt, 5–10°. | 9–11 | – | – | – | – | V 13 | 10 v | <i>Helichrysum petiolare</i> Asteraceae | Rabatteternell | Låg (–mellan) | Grått, gråvitbrokigt eller gulgrönt bladverk. Blommor obetydliga. | Växande, vällande, hängande, mattbildande. Kan stammas upp. | Mycket god — Favorit! | |
| Förökades förr ofta med sticklingar. Görs fortfarande då man vill bevara speciella sorter, t ex sådana med ljusviolett blomfärg. | 10–11 | 18–15° | 18–25° | lj | – | V 11 | – | 12 v | <i>Heliotropium arborescens</i> Boraginaceae | Heliotrop | Låg (–mellan) | Blåviolet med mörkt bladverk | Doftar. | Mycket god — Favorit! |
| Lägg fröna i varmt vatten 1 timme före sådd. | 9–10 | 20° | 22° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Hibiscus acetosella</i> (syn. <i>H. eetvelidianus</i>) Malvaceae | Blodhibiskus | Mellan | Rödbrunt bladverk, ingen blomning | Något glest och dåligt förgrenat växtsätt. Vackra i grupp. | Mycket god | |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 15 | – | 8 v | <i>Hordeum jubatum</i> Poaceae | Ekorkorn (gräs) | Mellan | Grågröna, senare sädessgula ax med brunviolett ton | Fjäderlikax med långa borst. Även eternell. | Mycket god — Favorit! | |
| Använd stora krukor och ge den en pinne att klättra på. | 11–12 | – | 15–18° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Humulus japonicus</i> Moraceae | Japansk humle | 3–5 m | Grönt bladverk, även vitbrokigt | Klättrande. Mycket kraftigväxande. | Mycket god | |
| Så ev 3–5 frön per slutkruka. Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 18 | – | 5 v | <i>Iberis amara</i> Brassicaceae | Blomsteriberis | Låg | Vit | | Mindre god — kort blomningstid | |
| Så ev 3–5 frön per slutkruka. Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | 14–10° | 16° | – | V 18 | – | 5 v | <i>Iberis umbellata</i> Brassicaceae | Roseniberis | Låg | Blandade färger, violett, rosa | | Mindre god — kort blomningstid | |
| Det finns numera även fröförökade lyckliga Lottor. Dessa har vi dock aldrig provat. | 10–11 | 15–18° | – | – | – | V 15 | 8 v fr. köpt | <i>Impatiens hawkeri</i> Balsaminaceae | Lyckliga Lotta | Låg | Röd, rosa, vit, violett. Några med mörkt bladverk, en del med gulbrokigt. Fröförökade — oftast i blandade färger. | Något vällande. Trivs bättre i urna än i rabatt. Verkar mer ljuskravande än den vanliga flitiga Lisan. | Mycket god | |
| Ränner lätt om de står trångt under odlingen. | 9–10 | 15–18° | 21–24° | lj | V 13 | – | 10 v | <i>Impatiens walleriana</i> Balsaminaceae | Flitiga Lisa | Låg | Röd, rosa, violett, vit, orange, även tvåfärgade | Vällande. Bra i urnor och balkonglådor. Klarar skugga bra. | Mycket god — Favorit! | |
| Kan behöva toppas. | 9–10 | 15–16° | 16–18° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Incarvillea sinensis</i> ssp. <i>variabilis</i> Bignoniaceae | Buskincarvillea | Låg–mellan | Gulvit | Växande, svävande, tillsammans med andra låga växter. | Mycket god | |
| Så 2–3 frön per kruka. Plantera senare om i större kruka och ge plantan en pinne att klättra på. | 9–10 →15 | – | 18–20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Ipomoea lobata</i> (syn. <i>Mina l.</i>) Convolvulaceae | Spaniska flaggan | 2–3 m | Röd–gul, knoparna röda, blomman bleknar efterhand till ljusgult | Klättrande. | Mycket god | |
| Kan toppas. Vill ha relativt varmt över vintern, minst 10°, gärna 15–18°. Ljust. | 9–10 | – | – | – | V 13 | 10 v | <i>Tresine lindenii</i> Amaranthaceae | Höblomster | Låg–mellan | Brunrött bladverk | Något klippbar. | Mycket god | | |
| | 10–11 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Lagenaria siceraria</i> Cucurbitaceae | Flaskkurbits, även kalebass | 2–3 m | Mångformiga dekorativa frukter i blekt gröngult | Klättrande. Frukterna kan torkas. | Mycket god | |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Lagurus ovatus</i> Poaceae | Harsvans (gräs) | Mellan | Gråludna ax | Även eternell. | Mycket god — Favorit! | |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 17 | – | 6 v | <i>Lamarcia aurea</i> Poaceae | Guldäxing (gräs) | Låg | Först ljusgröna, senare gula ax | | God | |
| Sätt 2–3 sticklingar per kruka. Övervintras ljus och svalt. | 10–11 | – | – | – | V 14 | 9 v | <i>Lamiastrum galeobdolon</i> ssp. <i>argentatum</i> Lamiaceae | Praktgulplister | Låg | Grågrönbrokigt bladverk (gula blommor) | Mattbildande (rotsläende), hängande. Bra i skugga. Kan även användas som perenn, då som marktäckare i skugga. | God | | |
| Sätt 2 sticklingar per kruka. Bör toppas. Angrips ofta av vita flygare. Övervintras ljus och svalt, ca 10°. | 9–10 | 20–18° | – | – | V 11 | 12 v | <i>Lantana camara</i> Verbenaceae | Eldkrona | Låg | Finns i orange, gula, vita och violetta nyanser. Ofta tvåfärgade. | Kan stammas upp. Önskas större exemplar använt övervintringsplanta. | God — angrids lätt av vita flygare. | | |

| Odlings- kommentarer | Kruktillverkning | | | | | | Svenskt namn | Höjd | Färg | Växtart och användningstips | Pålitlighet och använtbarhet | | |
|--|------------------|--------------------|--------------|------------|-------|---------------|--|---|--|---|---|---|---|
| | Kruksterlek cm | Odlings-temperatur | Såtemperatur | Ljusgrunde | Såtid | Sticklingstid | Kulturtid | Vetenskapligt namn (Synonym) Familj | | | | | |
| Så 1–2 frön i varje kruka. Blötlägg fröna i ljummet vatten ett dygn före sådd för säkrare groning. Toppa plantorna lätt när de är 10 cm höga och ge dem en pinne att klättra på. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 8–9 | – | 16–20° | – | V 18 | – | 5 v | <i>Lathyrus odoratus</i> Fabaceae | Luktört | Mellan och 2–3 m | Många olika färger | Höga sorter är klättrande. Plocka bort överblommade blommor och fröbaljor för rikligare blomning. Doftar. | Mycket god |
| Kan även sås direkt på växtplatsen. | 10–11 | 15° | 15–20° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Lavatera trimestris</i> Malvaceae | Sommarmalva | Mellan–hög | Rosa, vita sidenglänsande blommor. | | Mycket god — Favorit! |
| | 9–10 | 13–15° | 18–20° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Leucanthemum × superbum</i> (syn. <i>Chrysanthemum × s.</i>) Asteraceae | Jätteprästkrage | Låg | Vit (gul disk) | Kan även användas som perenn. Endast den låga sorten 'Snow Lady' används som sommarblomma. | Mycket god |
| Sticklingarna växer långsamt i början. Önskas kraftiga plantor — använd höststicklingar. Övervintras i just och svalt, 5–10°. | 9–10 | – | – | – | V 11 | – | 12 v | <i>Leucophyta brownii</i> (syn. <i>Calocephalus b.</i>) Asteraceae | Silbergirland | Låg | Grått bladverk (gula blommor på äldre exemplar) | Vällande, hängande, vävande, mattbildande. | Mycket god — Favorit! |
| Lägg ev fröna i ljummet vatten över natten innan sådd. Det påskyndar groningen. | 9–10 | – | 18–20° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Limonium sinuatum</i> Plumbaginaceae | Blårisp | Låg–mellan | Blå, rosa, gul, violett, ljusorange, vit | Tål torka. Även eternell. | Mycket god |
| Sådd se <i>Limonium sinuatum</i> . | 9–10 | – | 21° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Limonium suworowii</i> (syn. <i>Psylliostachys s.</i>) Plumbaginaceae | Axrisp | Mellan | Rosa | Tål torka. Även eternell. | Mycket god |
| Sådd se <i>Limonium sinuatum</i> . | 9–10 | – | 18–20° | – | V 10 | – | 13 v | <i>Limonium tetragonum</i> (syn. <i>L. sinensis</i>) Plumbaginaceae | Slöjrisp | Låg | Tvåfärgad gul och vit | Tål torka. Även eternell. | Mycket god — dock något trög i starten. |
| Plantorna övervintras från år till år, i just och mycket svalt (0–5°). Dela plantorna i febr–mars och plantera 3 rosetter per kruka. | 10–15 | 16–12° | 18–20° | – | – | V 9 | 14 v | <i>Lobelia cardinalis</i> ssp. <i>graminea</i> Campanulaceae | Praktlobelia | Hög | Röd, rödbrunt bladverk | Spiror. | God |
| Så 10–20 frön direkt i slutkruka. | 7–8 | 15° | 20–24° | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Lobelia erinus</i> Compacta-gruppen Campanulaceae | Kantlobelia, kaplobelia | Låg | Blå, blåviolett, rödviolett, vit, med och utan vitt öga, tvåfärgad blå/vit. Det finns även sorter med mörka blad. | Vällande. | God—mycket god — Favorit! Mestadels mycket god, men kan ibland plötsligt tyna bort. |
| Så 10–20 frön direkt i slutkruka. För att få en fylligare hänglobelia brukar vi blanda i 50% kantlobelialönen av samma färg. | 7–8 | 15° | 20–24° | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Lobelia erinus</i> Pendula-gruppen Campanulaceae | Hänglobelia, kaplobelia (fröförökade) | Låg | I stort sett samma som ovan. | Hängande. | Mycket god — Favorit! |
| Övervintras i just och svalt. | 9–10 | – | – | – | V 14 | 9 v | <i>Lobelia erinus</i> Pendula-gruppen Campanulaceae | Hänglobelia (sticklingsförökade) | Låg | Sorten 'Richardii' har ljusblå blommor och mörkt bladverk | Vällande, något hängande. | God — blommar dåligt en period mitt på sommaren. | |
| De små fröplantorna växer långsamt. Plantorna kan övervintras från år till år (just och mycket svalt, 0–5°). Blir snabbare kraftiga då. Dela i så fall plantorna i febr–mars och plantera 3 rosetter per kruka. | 9–10 →15 | 16° | 18–20° | Lj | V 7 | – | 16 v | <i>Lobelia × speciosa</i> Campanulaceae | Rabattlobelia | Mellan–hög | Röd, rosa, violett | Spiror. | God |
| Så 3–5 frön per slutkruka. | 7–8 | – | – | Lj | V 12 | – | 11 v | <i>Lobelia tenuior</i> Campanulaceae | Klaselobelia | Låg | Blåviolett | | Mycket god |
| Sätt 2–3 plantor per kruka. | 8–9 | 12–14° | 18–20° | Lj | V 7 | – | 16 v | <i>Lobelia valida</i> Campanulaceae | Viollobelia | Låg | Blå | | Vi har inte tillräcklig erfarenhet av denna växt för att kunna bedöma dess pålitlighet. |
| Så 5–10 frön per slutkruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 7–8 | 12–15° | 18° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Lobularia maritima</i> Brassicaceae | Strandkrassing | Låg | Vit, rosa, violett | Vällande, mattbildande. Tål torka bra. Doftar. | Mycket god |
| Ge den en pinne att klättra på. | 10–11 | – | – | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Lophospermum erubescens</i> (syn. <i>Asarina e.</i>) Scrophulariaceae | Lejongapsranka | 2 m | Rosa, vit | Klatrande. | Mycket god |
| | 9–10 | – | – | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Lophospermum purpusii</i> (syn. <i>Asarina p.</i>) Scrophulariaceae | Låg lejongapsranka | Låg | Rödviolett | Vällande, hängande. Tål halvskugga. | God |

| Odlings- kommentarer | Kruktöle cm | Odlingstemperatur | Sättemperatur | Ljusgrönande | Såtid | Sticklingstid | Kulturtid | Vetenskapligt namn (Synonymer) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Växtart och användningsips | Pålitlighet och använtbarhet |
|--|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------|---------------|-----------|--|-------------------------------------|----------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | 10–13° | 15–20° | Lj | V 16 | – | 7 v | <i>Matthiola incana</i> Brassicaceae | Lövkoja | Mellan | Rosa, vit, violet, ofta blandade | Doftar | God |
| Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | 10° | 15° | Lj | V 17 | – | 6 v | <i>Matthiola longipetala</i> v. <i>bicolor</i> (syn. <i>M. bicornis</i>) Brassicaceae | Grekisk lövkoja | Mellan | Violett | Doftar | God |
| Ge den en pinne att klättra på. | 10–11 | – | – | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Maurandella antirrhiniflora</i> (syn. <i>Asarina a.</i>) Scrophulariaceae | Liten maurandia | 1–2 m | Blåviolett, mörkröd | Klättrande. Tål halvskugga. | Mycket god |
| Ge den en pinne att klättra på. | 10–11 | – | 18–21° | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Maurandya barclaiana</i> (syn. <i>Asarina b.</i>) Scrophulariaceae | Maurandia | 2 m | Rosa, violett, vit | Klättrande. Tål halvskugga. | Mycket god |
| Ge den en pinne att klättra på. | 10–11 | – | – | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Maurandya scandens</i> (syn. <i>Asarina s.</i>) Scrophulariaceae | Kal maurandia | 2 m | Rosa, violett, vit | Klättrande. Tål halvskugga. | Mycket god |
| Får ej torka ut. | 9–10 | 15° | 18° | – | V 15 | – | 8 v | <i>Mauranthemum paludosum</i> (syn. <i>Chrysanthemum paludosum</i>) Asteraceae | Pysslingkrage | Låg | Vit (gul disk) | Bra som framkant. | God |
| | 9–10 | 18–15° | 20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Melampodium divaricatum</i> (syn. <i>M. paludosum</i>) Asteraceae | Medaljongblomster | Låg–mellan | Gul | | Mycket god |
| Kan säs med 3–5 frön direkt i slutkruka. Vi brukar dock skola som vanligt och kruka en och en. | 8–9 | 12–15° | 15–21° | Lj | V 17 | – | 6 v | <i>Mimulus × hybridus</i> Scrophulariaceae | Brokgryckelblomster | Låg | Gul, orange, röd, rosa, gulvit, vissa sorter är fläckiga | Vällande. Gillar fukt. Har ofta en svacka i blomningen mitt i sommaren. Plocka bort fröställningarna för att plantan ska blomma om. | Mycket god — Favorit! |
| | 10–11 | 14–16° | 16–20° | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Moluccella laevis</i> Lamiaceae | Musselsyska även Irlands klockor | Mellan–hög | Ljusgröna foderblad, oansenliga vita blommor | Spiror. Även eternell. | Mycket god |
| Kan även säs direkt på växtplatsen. | 10–11 | – | 16–18° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Nicandra physalodes</i> Solanaceae | Ballongblomma även leanderklocka | Mellan–hög | Blåviolett, även de blåvioleta fröställningarna är dekorativa | Blommorna sluter sig på kvällen. Fröställningarna kan även användas som eternell. Självsår sig lätt. | Mycket god |
| | 10–11 | 16° | 20–24° | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Nicotiana alata</i> v. <i>grandiflora</i> Solanaceae | Stor blomstertobak | Mellan–hög | Vit | Vävande. Doftar på kvällen. | God — slår ihop blommorna soliga dagar. |
| | 11–12 | 15–18° | 20° | Lj | V 13 | – | 10 v | <i>Nicotiana langsdorffii</i> Solanaceae | Klocktobak | Mellan–hög | Gulgrön | Vävande. | Mycket god |
| | 10–11 | 16° | 20–24° | Lj | V 13 | – | 10 v | <i>Nicotiana Sanderæ</i> -gruppen Solanaceae | Blomstertobak | Låg–mellan–hög | Rosa, rosaröd, rödviolett, vit, gulgrön | Vävande (de högre sorterna). Klarar halvskugga. | Mycket god — Favorit! |
| Behöver stor kruka och mycket näring. Plantan kräver stort utrymme vid odlingen. | 11–12 →15 | 16° | 20–24° | Lj | V 10 | – | 13 v | <i>Nicotiana silvestris</i> Solanaceae | Narcisstobak | Hög | Vit | Stätf! En av de bästa höga. Klarar någon skugga. Doftar på kvällen. | Mycket god — Favorit! |
| Kan toppas tidigt för buskigare planta. | 9–10 | 15–17° | 18–20° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Nierembergia hippomanica</i> Solanaceae | Nierembergia | Låg | Vit, violett | Vällande. | Mycket god |
| Skola 2–3 plantor per kruka. Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Nigella damascena</i> Ranunculaceae | Jungfrun i det gröna | Mellan | Blå, rosa, vit | Vävande, svävande. Frökapseln kan användas som eternell. | God — blommar inte hela sommaren. |
| Skola 2–3 plantor per kruka. Kan även säs direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Nigella hispanica</i> Ranunculaceae | Spaniska jungfrun | Mellan | Blåviolett | Vävande, svävande. Frökapseln kan användas som eternell. | God — blommar inte hela sommaren. |
| Säs 3–5 frön per slutkruka. Kan även säs direkt på växtplatsen. | 7–8 | 16° | 20° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Nolana napiformis</i> Nolanaceae | Cymbalblomma | Låg | Blå med ljust svalg | Vällande, nästan hängande. Mattbildande. Tål torka bra. Sluter blommorna på kvällen. | Mycket god |

| Odlings- kommentarer | Kruktöle cm | Odlings-temperatur | Såtemperatur | Lusgrönande | Sätd | Sticklingstid | Kulturtid | Vetenskapligt namn (synonym) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Vad sätts och användningstips | Plantlighet och användbarhet |
|--|----------------|--------------------|--------------|-------------|------|---------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. | 10–11 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Panicum miliaceum</i> 'Violaceum' Poaceae | Hirs (gräs) | Mellan–hög | Bruna, hängande vippor | | Mycket god |
| Av långsamt växande sorter som den orangefärgade 'Stadt Bern' kan man behöva ta sticklingarna tidigare eller använda höststicklingar i planteringarna. Övervintras i just och svalt, 5–10°. | 11–12 | 15–20° | – | – | – | V 10 (V 13 köpt) | 13 v fr. stickl. 10 v fr. rotad stickl. | <i>Palargonium × hortorum</i> Geraniaceae | Pelargon (sticklingsförförkad) | Låg–mellan | Röd, rosa, rosaviolett, vit, orange | Kan stmmas upp. Önskas kraftigare planta använd övervintringsplanta. Behöver puttas, särskilt de dubbla sorterna där blomman lätt ruttnar i fuktigt väder. | Mycket god |
| Så 1–2 frön per kruka. Om två frön gror i samma kruka, klipp bort den ena plantan. | 7–8 →12 | 16–20° | 21–24° | – | V 8 | – | 15 v fr. frö | <i>Palargonium × hortorum</i> Geraniaceae | Pelargon (fröförförkad) | Låg–mellan | Röd, rosa, rosaviolett, vit, orange | Fröpelargon är självrensande på så sätt att de tappar kronbladen när de blommat över. Bra egenskap utomhus, men sämre inomhus — skräpar. Putsa bort fröställningarna. | Mycket god — Favorit! |
| Sätt 1–2 sticklingar per kruka. Kan behöva toppas. Övervintras i just och svalt, 5–10°. Det finns även fröförökade sorter. Så dessa som fröförökad vanlig pelargon, men sätt 2 plantor per kruka. | 9–10 | 15–20° | – | – | – | V 10 (V 13 köpt) | 13 v fr. stickl. 10 v fr. rotad stickl. | <i>Pelargonium peltatum</i> Geraniaceae | Hängpelargon | Låg | Röd, rosa, violett, vit | Hängande. | Mycket god — Favorit! |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. | 9–10 | – | – | – | V 8 | – | 15 v | <i>Pennisetum setaceum</i> (syn. <i>P. rueppellii</i> och <i>P. rueppelianum</i>) Poaceae | Fjäderborstgräs | Mellan | Brunröda, smala ulliga ax | | Mycket god |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. | 9–10 | – | – | – | V 11 | – | 12 v | <i>Pennisetum villosum</i> Poaceae | Dunborstgräs | Mellan | Gråaktiga ax med långa borst | | Mycket god |
| Kan toppas för att bli buskigare. | 10–11 | 12–15° | 18–20° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Perilla frutescens</i> 'Nankinensis' Lamiaceae | Bladmyntra | Mellan | Brunviolett bladverk med metallglans | | Mycket god |
| | 9–10 | 10–12° | 18° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Persicaria capitata</i> (syn. <i>Polygonum capitatum</i>) Polygonaceae | Slingerpilört, även ampelpilört | Låg | Rosa, blyga blomax, brunaktigt bladverk | Mattbildande, rotsländande, något hängande. Tål någon skugga. Självsår sig lätt. | Mycket god |
| | 10–11 | – | – | – | V 9 | – | 14 v | <i>Persicaria orientalis</i> (syn. <i>Polygonum orientale</i>) Polygonaceae | Purpurpilört | Hög, 1–2 m | Rosa | Tål någon skugga. | God |
| Vissa sorter speciellt av multiflorasorterna kan behöva en lätt toppling i ett tidigt skede. Dubbelblommade sorter behöver någon vecka längre odlingstid. | 9–10 | 16° | 20° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Petunia × hybrida</i> Solanaceae | Petunia | Låg | Röd, rödviolett, violett, blåvioletts rosa, vit, gul, även tvåfärgade | Vällande. Multiflorasorterna har fler men mindre blommor och tål regn bättre än grandiflorasorterna. Vita, blå och violetta sorter doftar ofta. | Mycket god — Favorit! Regniga perioder kan förstöra blomningen. Nya regntäliga sorter finns nu på marknaden. |
| Behöver toppas. | 10–11 | 16–18° | – | – | – | V 15 köpt | 8 v fr. rotad stickl. | <i>Petunia × hybrida</i> Surfinia-gruppen m.fl. Solanaceae | Praktpetunia | Låg, meterlånga rankor | Rosa, vit, violett | Mattbildande, hängande. Rikblommande och vindtålig. | Mycket god |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Phalaris canariensis</i> Poaceae | Kanariegräs | Mellan | Grågröna ax | | God |
| Så 2 frön per kruka. Plantera senare om i slutkruka och ge plantan en pinne att klättra på. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 7–8 →15 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Phaseolus coccineus</i> Fabaceae | Rosenbönja | 2–4 m | Orangeröd, vit | Klättrande. Baljorna kan ätas men först efter kokning. | Mycket god |
| | 9–10 | 13–15° | 18° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Phlox drummondii</i> Polemoniaceae | Sommarflox | Låg, mellan | Röd, rosa, blåvioletts, violett, vit, gul | Vällande. Något vävande. | Mycket god — Favorit! |
| Övervintras i just och svalt, ca 10°. | 9–10 | – | – | – | – | V 14 | 9 v | <i>Pilea microphylla</i> Urticaceae | Mosspilea | Låg | Grönt, mycket småbladigt bladverk. Obetydliga blommor som ger väten en brunaktig ton på sensommaren. | Bra som framkant. | Mycket god |

Odlings-
kommentarer

| | Kruks storlek cm | Odlings-temperatur | Såf-temperatur | Ljusgrönende | Såtid | Sticklingstid | Kulturtid | Växtnamn (synonym) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Växtart och användnings-tips | Pålitlighet och användbarhet |
|--|-------------------|---------------------|----------------|--------------|-------|---------------|--|--|----------------------------|--|--|---|--|
| Övervintras i just och svalt, 5–10°. | 10–11 | – | – | – | – | V 13 | 10 v | <i>Plecostachys serpyllifolia</i> säljs även som "Helichrysum microphyllum" Asteraceae | Silvereternell | Låg | Grått bladverk, blommor obetydliga | Vävande, vällande, hängande och mattbildande. Kan stamas upp. | Mycket god — Favorit! |
| Övervintras i just och svalt, 5–10°. | 10–11 | – | – | – | – | V 14 | 9 v | <i>Plectranthus forsteri 'Marginatus'</i> Lamiaceae | Söderhavsljus, brokbladigt | Låg | Vitbrokiga blad | Vävande, vällande, hängande, mattbildande (rotsläende). Kan stamas upp. | Mycket god |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Polypogon monspeliensis</i> Poaceae | Skäggräs | Mellan | Gråbruna ulliga ax | Även eternell. | God |
| Så 5–10 frön per slutkruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 8–9 | 15° | 20° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Portulaca grandiflora</i> Portulacaceae | Praktportlak | Låg | Oftast blandade färger i rosa, orange, rött, gult, vitt | Klarar torka och näringsfattig jord. | God — blommorna stänger sig i mulet väder. |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. | 9–10 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Rhynchospora repens</i> (syn. <i>Tricholaena rosea</i>) Poaceae | Rosengräs | Mellan | Rosabruna vippor | Även eternell. | Mycket god |
| Så 1–2 frön per kruka. Om båda fröna gror, klipp bort den ena plantan. Plantera i större kruka 1–2 ggr. Kräver mycket gödsel. Lägg gärna en näve brunnen kogödsel i botten på krukan. Sådan finns att köpa i säck. | 7–8 →12 →20 | 16–18° 20–22° | – | V 10 | – | 13 v | <i>Ricinus communis</i> Euphorbiaceae | Ricin | Hög, 1,5–2 m | Blad brunröda eller grågröna beroende på sort. Blommor obetydliga. | Stärtig! En av de bästa höga. Vackra frukter, särskilt den mörkbladigas röda. Obs! Frökapsslarna är giftiga. | Mycket god — Favorit! | |
| | 10–11 | 16° | 18–21° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Rudbeckia hirta v. pulcherrima</i> (syn. <i>R. bicolor</i>) Asteraceae | Sommarrudbeckia | Låg, mellan, hög | Orange, gula, brunröda nyanser | Vävande (de mellan–höga). | Mycket god — Favorit! |
| | 9–10 | 15–16° | 18–20° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Salpiglossis sinuata</i> Solanaceae | Trumpetblomma | Mellan (–hög) | Blandade färger vanligast, samt violett och vit | | God |
| | 10–11 | 16–22° | 20° | Lj | V 12 | – | 11 v | <i>Salvia coccinea</i> Lamiaceae | Scharlakanssalvia | Mellan | Röd, rosa, vit | Något vävande. | Mycket god |
| | 10–11 | 15–18° | 20–25° | Lj | V 12 | – | 11 v | <i>Salvia farinacea</i> Lamiaceae | Daggsalvia | Mellan (även höga finns) | Blåviolett, silvergrå, ny blåviolettsilver | Spiror. | Mycket god — Favorit! |
| | 10–11 | 15–18° | 20° | Lj | V 13 | – | 10 v | <i>Salvia patens</i> Lamiaceae | Blåsalvia | Mellan–hög | Klarblå, ljust klarblå | Vävande. | Mycket god — Favorit! |
| | 10–11 | 15–18° | 20–25° | Lj | V 13 | – | 10 v | <i>Salvia splendens</i> Lamiaceae | Praktsalvia | Låg–mellan | Röd, även brunviolett, ljusviolett, blekorange, gulgrön (blommor och högblad) | Spiror. | Mycket god |
| | 10–11 | 15–18° | 20° | Lj | V 15 | – | 8 v | <i>Salvia viridis</i> (syn. <i>S. horminum</i>) Lamiaceae | Broksalvia | Mellan | Blåviolet, rosa, vit blomställning (egentligen högblad, blommor obetydliga) | Även eternell. | God — blommor inte hela sommaren. |
| Den vanligaste förökningssmetoden är med sticklingar. Moderplantor övervintras i just och svalt, 5–10°. Toppas för knubbigare planta. Vid frösädd — ställ sådden varmt något dyrn, sen svalt (ca 4°). | – | 20° senare 4° | – | – | V 8 | V 10 | 15 v fr. frö 13 v fr. stickl. | <i>Santolina chamaecyparissus</i> ssp. <i>chamaecyparissus</i> Asteraceae | Grå helgonört | Låg | Grått bladverk (gula blommor på äldre exemplar) | Kantväxt, klippbar, bra till figurrabatter. Önskas större exemplar, använd höststickling eller övervintringsplanta. Aromatiskt bladverk. Tål torka bra. | Mycket god |
| Toppas för knubbigare planta. Höststicklingarna har ibland varit något svårrotade. Övervintras i just och svalt, 5–10°. | 7–8 | – | – | – | – | V 10 | 13 v | <i>Santolina rosmarinifolia</i> Asteraceae | Grön helgonört | Låg | Grönt bladverk (gula blommor på äldre exemplar) | Se <i>Santolina chamaecyparissus</i> . | Mycket god |
| Så 3–5 frön per slutkruka. | 8–9 | 18° | 20° | – | V 15 | – | 8 v | <i>Sanvitalia procumbens</i> Asteraceae | Husarknappar | Låg | Gul, orange (med brun disk) | Mattbildande. Bra som framkant. | Mycket god |
| | 9–10 | – | – | – | V 16 | – | 7 v | <i>Scabiosa atropurpurea</i> Dipsacaceae | Praktvädd | Mellan–hög | Oftast blandade färger, samt ljust violett | Vävande, svävande. | Mycket god |
| Bör toppas. | 9–10 | 14–18° | – | – | – | V 14 köpt | 9 v fr. rotad stickl. | <i>Scaevola aemula</i> Goodeniaceae | Femtunga | Låg | Violett | Mattbildande, hängande, vällande. | Mycket god — Favorit! |

| Odlings- kommentarer | Kruktorlek cm | Celsingtemperatur | Sätemperatur | Ljusgivande | Såtid | Stickningstid | Kulturtid | Vetenskapligt namn (Synonymer) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Växtart och användningstips |
|---|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------|---------------|---|---|---|-------------------|--|--|
| | 9–10 | 15–17° | 20° | Lj | V 11 | – | 12 v | <i>Senecio cineraria</i> Asteraceae | | | | |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Setaria italica v. longiseta</i> (syn. <i>S. macrochaeta</i>) Poaceae | Hängkolvhirs (gräs) | Mellan–hög | Gulbruna, hängande kolvar | Även eternell. |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Setaria pumila</i> (syn. <i>S. glauca</i>) Poaceae | Grå kavelhirs (gräs) | Mellan–hög | Gråbruna, smala ax. | Även eternell. |
| Så 5–10 frön per slutkruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 7–8 | – | – | – | V 17 | – | 6 v | <i>Silene coeli-rosa</i> Caryophyllaceae | Nejlikglim | Låg | Blå, rosa | |
| Behöver retarderas för att få det utseende vi är vana vid. Annars får man acceptera att den blir mindre kompakt och fär en glesare blomming. Övervintras ljust och svart. | 10–11 och upptå | – | – | – | – | V 10 | – | <i>Solanum rantonettii</i> Solanaceae | Himmelsöga, även blå potatisbuske | Mellan–hög | Violett med gul mitt | Stammas upp till ett litet träd eller används som buskplanta. |
| Kan behöva toppas. Övervintras ljust och relativt varmt, ca 15°. | 9–10 | – | 21–24° | Lj | V 9 | V 13 | 14 v fr. frö. 10 v fr. stickl. | <i>Solenostemon scutellarioides</i> (syn. <i>Coleus blumei</i>) Lamiaceae | Palettblad | Låg–mellan | Bladverk i många färger, blommor obetydliga | Plocka bort blomställningen för bättre bladfärg och tillväxt. |
| Kan även sås direkt på växtplatsen. | 10–11 | – | – | – | V 14 | – | 9 v | <i>Sorghum nigrum</i> Poaceae | Durra (gräs) | Hög | Kraftig svartbrun vippa | Även eternell. |
| Sätt 3–5 plantor per kruka. | 9–10 | 18–22° | 18–22° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Stipa tenuissima</i> , säljs även som "S. tenacissima" Poaceae | Svans-ljädergräs | Mellan | | Axen har långa svepande borst. Även eternell. |
| Vissa sorter av <i>Tagetes erecta</i> brukar kortdagsbehandlas. Vi har dock inte möjlighet till detta, men alla sorter vi provat blommar bra ändå. Plantorna blir dock något högre än vad som anges i frökatalogen. Angående skolning, se <i>Tagetes patula</i> . | 10–11 | 17–15° | 20° | – | V 13 | – | 10 v | <i>Tagetes erecta</i> Asteraceae | Stort sammetsblomster, tagetes | Låg–mellan (–hög) | Gul, orange, gulvit | Putsas. De fyllda blomställningarna rullna och bli bruna vid ihållande eller vid vattning med spridare. De låga sorterna är bra som framkall. |
| Angående skolning, se <i>Tagetes patula</i> . | 9–10 | 17–15° | 20° | – | V 15 | – | 8 v | <i>Tagetes erecta</i> × <i>tenuifolia</i> Asteraceae | Litet hybridsammetsblomster, tagetes | Mellan | Gulorange | |
| Behöver mestadels inte skolas utan kan krukas direkt från såldan. | 9–10 | 17–15° | 20 | – | V 15 | – | 8 v | <i>Tagetes patula</i> Asteraceae | Sammetsblomster, tagetes | Låg–mellan | Gul, orange, brunröd | De låga sorterna är bra som framkall. Putsas, se <i>Tagetes erecta</i> . |
| Angående skolning, se <i>Tagetes patula</i> . | 9–10 | 17–15° | 20° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Tagetes tenuifolia</i> (syn. <i>T. signata</i>) Asteraceae | Litet sammetsblomster, tagetes | Låg–mellan | Gul, orange, brunröd | |
| Triplioda sorter har lägre grobarhet. Angående skolning, se <i>Tagetes patula</i> . | 9–10 | 17–15° | 20° | – | V 15 | – | 8 v | <i>Tagetes</i> — triplioda sorter Asteraceae | Sammetsblomster, tagetes | Låg–mellan | Gul, orange, brunröd | Sätter inte frö, vilket medför nikare och mer ihållande blomning. |
| | 9–10 | 17–15° | 18–20° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Tanacetum parthenium</i> (syn. <i>Chrysanthemum parthenium</i>) låga sorter tex 'Santaña' Asteraceae | Mattram | Låg | Gulvit, ljust gul | Bra som framkall. |
| | 10–11 | 17–15° | 18–20° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Tanacetum parthenium</i> (syn. <i>Chrysanthemum parthenium</i>) mellanhöga sorter tex 'Ball's White', 'Guldball' Asteraceae | Mattram | Mellan | Vit, gul | Vissa är vävande, gäller löst växande sorter som 'Ball's White'. |
| | 9–10 | 17–15° | 18–20° | – | V 11 | – | 12 v | <i>Tanacetum parthenium</i> (syn. <i>Chrysanthemum parthenium</i>) Sorter med gulgröna blad kallas (ibland även "Pyrethrum aureum") Asteraceae | Mattram | Låg | Gulgrönt bladverk (vita blommor) | Bra som framkall. En effektfull liten planta som används framförallt för sitt gulgröna bladverk. |

| Odlings- kommentarer | Kruktid cm | Odlings-temperatur | Såtempertur | Ljusgrönande | Sätid | Stickningstid | Kulturd | Vetenskapligt namn (Synony) Familj | Svenskt namn | Höjd | Färg | Växtart och användningstips | Pålitlighet och användbarhet |
|---|--------------|--------------------|-------------|--------------|-------|---------------|--|--|-----------------------------|----------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Moderplantor kan övervintras i just och svalt. | 9–10 | 18° | 18–20° | Lj | V 11 | V 13 | 12 v från frö. 10 v från stickl. | <i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> (syn. <i>Chrysanthemum ptarmiciflorum</i>) Asteraceae | Silverkrage | Låg–mellan | Grått bladverk | Önskas större exemplar använd övervintringsplantor. | Mycket god |
| Så 3 frön per slutkruka. Ge plantan en pinne att klänga på. | 9–10 | 15–16° | 20° | – | V 16 | – | 7 v | <i>Thunbergia alata</i> Acanthaceae | Svartläga | 1–1,5 m | Gul, vit, orange med svart öga | Klättrande. | Mycket god |
| Ge stora krukor och extra gödsel. Mår bra av att odlas på undervarme. | 10–11 →15 | 18–20° | 20° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Tithonia rotundifolia</i> Asteraceae | Inkkrage | Hög | Orange, gul | | God — får ofta torra bruna bladkanter. |
| | 10–11 | – | 17° | Lj | V 11 | – | 12 v | <i>Trachelium caeruleum</i> Campanulaceae | Halsört | Mellan | Violett, vit | Något vävande. | Mycket god |
| Fröna tar lång tid på sig för att gro. | 10–11 | – | 15° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Trachymene caerulea</i> (syn. <i>Didiscus caeruleus</i>) Apiaceae | Blåparasoll | Mellan | Ljust blåviolett | Vävande, svävande. | God — blommar inte hela sommaren. |
| Can sås direkt i krukan. Kan även sås direkt på växtplatsen. Ge plantan en pinne att klättra på eller låt den hänga över bordssidan. | 10–11 | 15° | 18–20° | – | V 15 | – | 8 v | <i>Tropaeolum majus</i> Lobbianum-gruppen Tropaeolaceae | Slingerkrasse, indiankrasse | 1–3 m | Gul, orange, röd, ofta blandade färger | Klättrande, hängande, mattbildande. Värme gynnar frösättning — putsa! | Mycket god — Favorit! |
| Kan sås direkt i krukan. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 10–11 | 15° | 18–20° | – | V 15 | – | 8 v | <i>Tropaeolum majus</i> Nanum-gruppen Tropaeolaceae | Buskkrasse, indiankrasse | Låg | Gul, orange, röd, ofta blandade färger | Vällande, mattbildande. Värme gynnar frösättning — putsa! | Mycket god — Favorit! |
| Ge den en pinne att klättra på. Kan sås direkt i krukan. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 9–10 →12 | 15° | 18–20° | – | V 17 | – | 6 v | <i>Tropaeolum peregrinum</i> Tropaeolaceae | Fjärilskrasse | 2–4 m | Gul | Klättrande, hängande. | Mycket god — Favorit! |
| Skola 3 plantor per kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen. | 8–9 | – | – | – | V 17 | – | 6 v | <i>Vaccaria hispanica</i> Caryophyllaceae | Åkernejlika | Mellan | Vit, rosa | Vävande, svävande. | God — blommar inte hela sommaren. |
| Låt sådden stå i rumstemperatur över natten. Ställ den sedan svalt (lått frost till +5°) i ca 1 vecka. Ta sedan in i värmen igen. Gror ej ämmt, groningstid 15–35 dagar. | 11–12 | 15–16° | 18–20° | – | V 8 | – | 15 v | <i>Verbena bonariensis</i> Verbenaceae | Jätteverbena | Hög | Violett | Vävande, svävande. | Mycket god — Favorit! |
| | 10–11 | 16° | 20° | – | V 12 | – | 11 v | <i>Verbena canadensis</i> (syn. <i>V. aubletia</i>) Verbenaceae | Doftverbena | Låg–mellan | Rödviolett | Vällande. | Mycket god |
| Sätt 2–3 sticklingar per kruka. Övervintras i just och svalt, 5–10°. | 10–11 | 18–22° | – | – | – | V 12 köpt | 11 v fr. rotad stickl. | <i>Verbena elegans</i> v. <i>asperata</i> Verbenaceae | Skär hängverbena | Låg | Rosa | Mattbildande, vällande, hängande. | Mycket god — Favorit! |
| Fröet sås i väl fuktad såjord. Strö över ett mycket tunt lager sand. Täck såkrukan med svart plast eller annat så att sådden står mörkt. När fröna grott — ställ i just. Kan behöva toppas. | 9–10 | 17–15° | 20–24° | – | V 10 | – | 13 v | <i>Verbena × hybrida</i> Verbenaceae | Trädgårdsverbena | Låg | Röd, rosa, vit, orange, blåviolet, violet | Något vällande. | God—mycket god, beroende på sort. Många får lätt mjöldagg. Sorten 'Blue Lagoon' är dock frisk. |
| Såmetod, se <i>Verbena bonariensis</i> . Groningstid 15–28 dgr. | 10–11 | 15–16° | 18–20° | – | V 8 | – | 15 v | <i>Verbena rigida</i> (syn. <i>V. venosa</i>) Verbenaceae | Violverbena | Mellan | Violett, ljusviolett | Vävande, svävande. | Mycket god — Favorit! |
| Sådd, se <i>Verbena × hybrida</i> | 10–11 | 15° | 20–24° | – | V 10 | – | 13 v | <i>Verbena speciosa</i> hort. Verbenaceae | Stor hängverbena | Låg | Violett, ljusviolett | Mattbildande, vällande, något hängande. | Mycket god — Favorit! |
| | 9–10 →12 | – | 21–27° | – | V 15 | – | 8 v | <i>Zea mays</i> Poaceae | Majs (gräs) | Hög | Prydnadsmajsens kolvar varierar i färg från gult, orange till rödbrunt. | Kan behöva bindas upp. Man kan vika ner täckbladen runt kolvarna för att de ska synas bättre. | God |
| | 10–11 | 15–18° | 20–25° | – | V 14 | – | 9 v | <i>Zinnia elegans</i> Asteraceae | Zinnia | Låg–mellan–hög | Rosa, röd, rödviolett, vit, ljusgrön, gul, orange. Ofta i blandade färger. | Höga sorter kan behöva bindas upp. | God—mycket god |

KOMMENTARER TILL ODLINGS- OCH ANVÄNDNINGSLISTAN

Canna × generalis – kanna

Kannorna grävs upp och tas in på hösten när de första nattfrosten förstört blommor och bladverk. Låt jorden runt rotssystemet vara kvar. Den skyddar de tjocka, näringsslårande jordstammarna mot alltför stark uttorkning. Även bladverket lämnas intakt.

De vilande plantorna övervintras nu svalt, 5–10°. Eventuellt båddas rotklumparna in i lätt fuktad torv.

I mars tas kannorna fram för inkrukning. De behöver drivas inomhus under några månader för att bli tillräckligt kraftiga och hinna utveckla blommor under sommaren.

Innan jordstammarna krukas in putsas de. De gamla stänglarna klipps ner och den torra jorden avlägsnas. Vill man ha fler plantor kan jordstammarna delas. Låt i så fall snittytan torka några dygn.

De planteras sedan tydligt i krukor. Kanner är mycket näringkrävande och behöver en bra planteringsjord. Blanda gärna i några nävar brunnen kogödsel i botten av krukan.

Vattna igenom krukorna ordentligt men vattna sedan inte ytterligare förrän skotten har börjat växa.

Placera krukorna varmt i ca 18–20°, gärna på undervärme. Till att börja med kan de stå mörkt, men så fort skotten börjar växa flyttas plantorna till ett ljust ställe, fortfarande varmt.

Kannorna gödselvattnas minst varannan vecka under våren och planteras sedan ut när risken för nattfrost är över.

Kanner övervintrar bäst om bladverket inte klipps ner och jorden runt jordstammarna lämnas kvar.



Echeveria – echeveria

I god tid före höstens första rejala nattfrost ska echevieriernas rosetter grävas upp och tas in. Då består plantan ofta av en hel grupp rosetter. Varje enskild rosett som man vill spara klipps loss från gruppen. Man bestämmer nu hur stor rosetten man vill ha kvar och skär därefter bort resten av bladen. Den kala stambiten som blir kvar kapas så att rosetten slutar i en 1–2 cm lång stam. Lägg rosetten med snittytan uppåt och låt den torka i minst 4–5 dagar.

Därefter ska echevierierna planteras. Om man har många är det bäst att sätta dem i lådor, annars en och en i krukor. Blanda lika delar planteringsjord och sand eller använd särskild kaktusjord. Fyll lådor eller krukor med jorden så att minst 3–4 cm återstår. Toppa med 2–3 cm sand.

Stick nu ner rosettens kala stamdel i sanden. Vattna försiktigt, helst utan att spilla i bladrosetten. Placera ljust i 15–20°, gärna på undervärme.

Vattna inte mer innan rosetterna har slagit rot. Att de fått rötter märker man lätt på att de sitter fast när man försöker lyfta dem. Rotningen brukar ta ett par veckor. Under vintern skall echevierierna stå ljus och svalt, 10–15°. Vattna sparsamt, någon gång i månaden brukar räcka!

När värmen och ljuset ökar på våren trappas vattningen upp något. Gödsla varannan vecka under våren med halv dos av ett flyttande gödselmedel.

Utplantning sker när risken för nattfrost är över.

Dahlia × hortensis – dahlia

En del höstar är dahlior som allra vackrast när det är dags att ta upp dem. För oss här på Botaniska bestäms tiden av att tulpan- och narcisslökar skall sättas. Utan lökplantering att ta hänsyn till anpassar man sig efter vädret.

Det är dags att ta upp dahliaknörlarna när några frostnätter skadat blommor och bladkanter, men innan kylan blivit alltför svår. I Göteborg sker det någon gång i början av oktober.

Så här går man tillväga:

Dahliplantorna grävs upp försiktigt och så mycket som möjligt av jorden skakas av. Stjälkarna klipps ner så att 10–15 cm återstår. Märk eventuellt sorterna med etiketter.

Lägg sedan knörlarna torrt i någon till några veckor. Växthus, garage eller källare kan vara lämpliga torkplatser.

När knörlar och jord torkat upp skakas resten av jorden av och sjuka eller skadade delar skärs bort. Låt eventuella snittytor torka några dagar.

Knörlarna läggs sedan i lådor eller backar i en blandning av sand och torvmull (det är viktigt att den inte är alltför fuktig) och vinterförvaras svalt, 4–8°. Förhållanden i en jordkällare är idealiska. Dahliaknörlar och potatis har liknande krav.

Kontrollera under vintern att temperaturen är den rätta och att det inte är alltför torrt eller alltför fuktigt. Ta bort knörlar med röta eller mögel.

Vill man att dahliorna skall blomma redan i början av sommaren måste man förkultivera dem.

Under sista delen av april eller i början av maj planteras knörlarna i krukor med planteringsjord. Knölen tillväxtpunkt skall vara strax ovanför jordytan.

Placera nu plantorna ljust – helst i växthus. Vattna direkt efter inkrukningen, sedan inte mer förrän knörlarna börjat skjuta skott. Gallra då så att endast 2–4 skott återstår på varje knörl.

Plantera ut dahliora när risken för nattfrost är över.

Man kan också plantera ut dahliaknörlarna utan att ha drivit dem i förväg, men då blommar plantorna först från senare delen av juli.

